

VARSTVO VINSKE TRTE

28. junij 2021

Vinska trta je na večini vinogradniških leg odcvetela in prehaja v fazo razvoja grozdličev. V drugi polovici tedna bodo lokalne plohe in nevihte pogostejše, zato se bo možnost za okužbe s **peronosporo in oidijem** ponovno povečala. Trta v tem obdobju intenzivno prirašča, zato jo je potrebno pravočasno zavarovati pred okužbami. Za varstvo pred **peronosporo** lahko uporabite pripravke s kombiniranim kontaktnim in sistemskim oz. polysistemskim načinom delovanja kot so **Acrobat MZ WG, Ampexio, Armetil M, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Folpan gold, Fortuna gold, Forum MZ WG, Forum star, Fudan gold, Gett, Magma Triple WG, Mikal flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Orondis, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Pergado SC, Profiler, Profilux, Reboot, Revus, Ridomil gold MZ pepite, Sanvino, Sfinga extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Valis M, Videryo F, Vincya F** ali **Zorvec Zelavin**. Uporaba slednjih je še posebej priporočljiva vinogradih, kjer imate letos več težav z obvladovanjem te bolezni. Sicer lahko uporabite lahko tudi fungicide z dotikalnim delovanjem kot so **Avtar 75 NT, Daimyo F, Delan pro, Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Solofol, Videryo F** ali **Vincya F**. Na voljo sta tudi pripravka **Cabrio top** ali **Universalis**, ki delujeta tudi proti oidiju. Pri uporabi kontaktnih pripravkov bodite pozorni, da škropilno oblogo obnavljate v tedenskih razmikih oz. da škropljenje ponovite prej v primeru, da pade več kot 25 mm padavin.

Napovedane vremenske razmere bodo za razvoj **oidija** zelo ugodne, zato za varstvo svetujemo uporabo pripravkov z učinkovitim dolgotrajnejšim delovanjem kot so **Baltazar, Collis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC, Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DF** ali **Vivando**. Škropivu dodajte tudi žveplo v zmanjšanem odmerku. Zaradi možnega fitotoskičnega učinka žveplovih pripravkov in učinkovitejše aplikacije škropilne brozge, svetujemo, da v obdobju visokih dnevniških temperatur škropljenje opravite v jutranjem ali večernem času. Za zatiranje oidija v ekološki pridelavi lahko poleg žvepla uporabite pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so **AQ 10, Taegro** ali **Sonata**. Uporabite lahko tudi pripravka s kalijevim hidrogen karbonatom kot sta **Karbicare** in **Vitisan**.

V primeru pojava neurij s točo dajte pri izbiri prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov folpet kot so **Forum star, Sfinga Extra WDG, Folpan gold, Valis F, Twingo, Sanvino, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum trio** ali **Magma triple WG**.

Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Besedilo: Primož Žigon, Kmetijski inštitut Slovenije