

ZATIRANJE JABOLČNEGA ZAVIJAČA

4. junij 2021

Ulovi metuljev jabolčnega zavijača na feromonske vabe so se v preteklem tednu povečali. Z otoplitvijo vremena in dvigom povprečnih temperatur zraka ob sončnem zahodu so bili izpolnjeni pogoji za parjenje metuljev jabolčnega zavijača, zato lahko v začetku prihodnjega tedna pričakujemo pričetek odlaganja jajčec. Takrat bo primeren čas za uporabo insekticidov **Insegar 25 WG** ali **Harpun**. Oba insekticida delujeta na odložena jajčeca zavijača, hkrati pa tudi na premikajoče se ličinke ameriškega kaparja. Pridelovalci, ki ne boste uporabili zgoraj naštetih pripravkov, lahko konec naslednjega tedna za zatiranje oz. zmanjševanje populacije jabolčnega zavijača uporabite pripravka **Coragen** ali **Exirel**. Oba insekticida delujeta tako na jajčeca kot tudi na izlegle gosenice. V nasadih, kjer ste imeli v preteklem letu močan napad škodljivca priporočamo dodajanje polovičnega odmerka pripravka na osnovi virusa granuloze (**Madex max** ali **Carpovirusine**), ki povzroča fiziološko oslabitev gosenic, ki so zato bolj občutljive na delovanje insekticida.



Slika: Metulja jabolčnega zavijača ujeta na feromonsko past (foto: arhiv KIS)

Insekticidi, ki jih uporabljamo za zatiranje jabolčnega zavijača so nevarni za čebele. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v času nočnem ali večernem času oz. takrat, ko so čebele v panjih.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Pripravil: David Snoj, Kmetijski inštitut Slovenije