

VARSTVO ČEBULNIC PRED ČEBULNO PLESNIJO IN ČESNOVO RJO

6. 6. 2022

Trenutne vremenske razmere niso optimalne za razvoj čebulne plesni. Na čebuli zaenkrat ne opazamo večjega pojava bolezni, vendar priporočamo redno pregledovanje rastlin. Zgodnja znamenja bolezni se kažejo v obliki svetlo zelenih do rumenkastih razbarvanih predelov na listih, na katerih se ob zadostni vlagi oblikuje sivkast poprh. Če opazite taka znamenja je čebulo potrebno zaščititi z ustreznimi fungicidi. Za zatiranje oz. za zmanjševanje okužb čebulne plesni lahko v čebuli uporabite sredstva kot so **Banjo, Chamane, Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuproxat, Mirador 250 SC, Norios, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zorvec Endavia** ali **Zoxis 250 SC**. Bodite pozorni tudi na česnovo rjo, ki se pojavlja na čebulnicah. V čebuli, česnu in šalotki je dovoljena uporaba sredstva **Cuprablau Z 35 WP**, v česnu in poru **Luna Experience**, na poru in spomladanski čebuli **Sercadis plus** in v poru **Signum**. Za ta namen lahko uporabite tudi katerega izmed pripravkov na osnovi a.s. azoksistrobin (**Chamane, Mirador 250 SC, Norios, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zoxis 250 SC**).

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!



Slika: Začetna znamenja okužbe s čebulno plesnijo (foto arhiv KIS).

Pripravila: Neja Marolt, Kmetijski inštitut Slovenije