

VARSTVO PARADIŽNIKA PRED PARADIŽNIKOVO PLESNIJO

29. junij 2020

Pridelovalce **paradižnika na prostem** opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere še vedno ugodne za razvoj in širjenje krompirjeve (paradižnikove) plesni. Priporočamo, da rastline zavarujete s fungicidom, saj je sicer tveganje za pojav bolezni veliko. Uporabite lahko katerega izmed navedenih fungicidov: **Acrobat MZ WG, Armetil M, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Forum MZ WG, Galben M, Gett, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Mirador 250 SC, Nautile DG, Ortiva, Pergado MZ, Pinozeb M-45, Polyram-DF, Revus**, ali katerega izmed bakrovih pripravkov: **Copforce Extra, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Curzate C Extra, Kocide 2000, Nordox 75 WG, Pergado C**. Poskrbite tudi, da bodo nasadi paradižnika čim bolj zračni in redno odstranjujte zalistnike.

Na paradižniku v zavarovanih prostorih opažamo začetna znamenja **rjave žametne paradižnikove pegavosti**, zato priporočamo redno prezračevanje zavarovanih prostorov in odstranjevanje obolelih listov.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!



Slika: Krompirjeva (paradižnikova plesen (foto arhiv KIS)

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije