

## VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

6. julij 2020

Sadjarjem priporočamo nadaljevanje preventivnega pristopa varstva z uporabo dotikalnih pripravkov kot so **Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC**, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih dotikalnih pripravkov. Presledki med škropljenji naj bodo predvsem prilagojeni količini padavin in zdravstvenemu stanju vašega nasada. Za varstvo ekoloških sadovnjakov lahko uporabite pripravka **Curatio-žvepleno apnena brozga** in **Vitisan**.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi **kaptana**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasadov. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov.

V nasadih spremljajte razvoj in napad škodljivih žuželk in pršic ter po potrebi opravite zatiranje z registriranimi pripravki.

### Jabolčni zavijač

V toplejših območjih se že pričinja let druge generacije jabolčnega zavijača. V nasadih, kjer ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe presegajo prag škodljivosti in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni je potrebno ponovno opraviti škropljenje. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite enega izmed pripravkov kot so **Affirm, Affirm opti, Mimic, Runner 240 SC, Delegate 250 WG** ali **Laser Plus**.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek **Madex max, Carpovirusine** ali **Laser plus**. Za varstvo pred drugimi škodljivimi gosenicami priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi *Bt*, kot je **Agree, Lepinox plus** ali **Delfin WG**. Opozajamo, da imajo virusni pripravki, izpostavljeni sončnemu sevanju zelo kratko življensko dobo.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!**

Pripravili: Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije