

V nasadih jablan in hrušk za preprečevanje okužb in širjenja **škrlupa** še naprej svetujemo redna preventivna škropljenja, ki jih izvajajte v približno dvotedenskih razmikih. Pogostost škropljenj prilagodite količini padavin in pri načrtovanju varstvenih ukrepov upoštevajte vremensko napoved. Za varstvo jablan je primerna uporaba kontaktnih pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so **Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC, Scab 80 WG**. Pri sortah, ki zgodaj dozorevajo, je namesto naštetih smiselno uporabiti pripravke s trifloksistobinom kot sta **Zato 50 WG in Zato plus**, ki preprečujejo razvoj poznega škrlupa in drugih skladiščnih bolezni na plodovih.

Zatiranje **jabolčnega zavijača** opravite v primeru, da ulovi metuljev na feromonske vabe presegajo prag škodljivosti. Ustrezna je uporaba katerega od insekticidov s krajšo karenčno dobo kot so **Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG** ali **Laser plus**. V ekoloških nasadih lahko uporabite pripravke: **Madex max, Carpovirusine** in **Laser plus**.

V nekaterih nasadih lahko v obdobju suhega in toplega vremena prihaja do prerazmnožitev **fitofagnih pršic**, zlasti navadne pršice in rdeče sadne pršice. Ob preseganju pragov škodljivosti lahko proti njim ukrepate z uporabo registriranih akaricidov kot so **Vertimec pro, Kanemite SC, Koromite** ali **Milbeknock**.

**Pri varstvu zgodnjih sort jabolk bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov! Pred škropljenjem z insekticidi odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih!**

Pripravil: Primož Žigon, Kmetijski inštitut Slovenije