

VARSTVO KUMAR in BUČNIC PRED KUMARNO PLESNIJO

27. julij 2020

Vremenske razmere z vmesnimi padavinami in visoko zračno vlago so ugodne za razvoj **kumarne plesni** na kumarah, bučkah in melonah, zato redno spremljajte morebiten pojav bolezni v zavarovanih prostorih in na prostem. Za zatiranje plesni lahko na kumarah uporabite sistemične fungicide na osnovi aluminijevega fosfata, kot sta **Aliette flash** in **Alleato 80 WG** in **Ridomil Gold MZ Pepite**. Uporaba sredstev **Enervin**, **Ranman top**, **Ortiva** in **Zaftra AZT 250 SC** je smiselna še pred razvojem bolezni. V ekološki pridelavi lahko v kumarah proti kumarni plesni uporabite bakrove pripravke, kot so **Champ formula 2 FLO**, **Champion 50 WG**, **Cuporxat**, **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP**, **Curzate C Extra** in sredstvo na osnovi glive *Pythium oligandrum* – **Polyversum**. V bučkah je za obvladovanje bolezni dovoljena še uporaba fungicida **Tanos 50 WG**, v melonah pa še **Revus**.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!



Slika: Kumarna plesen (foto arhiv KIS)

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije