

Pogoste lokalne plohe in nevihte, ki so se pojavljale v preteklih dneh, so izprale fungicidno oblogo, zato je za preprečevanje razvoja **poznega škrlupa** in **ostalih skladiščnih bolezni** potrebno obnoviti fungicidno oblogo. Za zaključna škropljenja zgodnjih sort jablan priporočamo uporabo pripravkov kot so **Bellis** (7 dni karence), **Geoxe** (3 dni), **Pomax** (5 dni), **Luna Care** (28 dni), **Luna Experience** (14 dni), **Switch** (3 dni) ali **Zato 50 WG** (21 dni). Uporabite lahko tudi pripravek na podlagi mikroorganizmov **Amylo-X** (brez karence) ali pripravek s kalijevim hidrogen karbonatom **Vitisan** (1 dan). Slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Pri sortah, ki dozorevajo pozneje (Idared, Braeburn, Fuji ipd.), je v avgustu še vedno priporočljivo opraviti škropljenje s pripravki na osnovi kaptana kot so **Zato plus** (35 dni), **Merpan 80 WDG** (28 dni), **Orthocide 80 WG** (28 dni), **Scab 80 WG** (21 dni) ali **Scab 480 SC** (21 dni).



Slika: Jablanov škrlup na plodovih (foto arhiv KIS)

Bodite pozorni na karenčne dobe uporabljenih pripravkov, še posebno na zgodaj zorečih sortah! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Pripravil: Primož Žigon, Kmetijski inštitut Slovenije