

## VARSTVO VINSKE TRTE

2. avgust 2021

Sezona rednih škropljenj v vinogradih se postopoma zaključuje. Vinogradnikom svetujemo, da v nadaljevanju opravijo še eno do dve škropljenji, odvisno od vremenskih razmer in zdravstvenega stanja vinske trte. Za varstvo pred **peronosporo** uporabite katerega od kontaktnih pripravkov na podlagi mankozeba kot so **Avtar 75 NT, Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45** (vsi 28 dni karence) ali folpeta kot so **Follow 80 WG, Folpan 80 WDG** (oba 35 dni) ali **Solofol** (28 dni). Za zaključna škropljenja je ustrezna tudi uporaba bakrovih pripravkov kot so **Badge WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, WG/ 50 WP/ Ultra WP, Cuproxat, Kocide 2000, Nordox 75 WG** (vsi 21 dni) ali kombinan pripravek z bakrom **Pergado C** (21 dni).

Ob pričetku zorenja jagod okužbe z **oidijem** niso več možne. Pred tem za preprečevanje razvoja omenjene bolezni, škropivu dodajte katerega od registriranih žveplovih pripravkov kot so **Azumo WG, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol special / disperss, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin, Pol-Sulphur 80 WG/ WP, Pol-Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** (vsi 28 dni karence). Uporabite lahko tudi pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so **AQ 10, Taegro** in **Sonata** ali pripravka s kalijevim hidrogen karbonatom kot sta **Karbicure** in **Vitisan**.

**Pri izbiri sredstev bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**

Besedilo: Primož Žigon, Kmetijski inštitut Slovenije