

## VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

3. avgust 2020

Nestanovitno vreme z obilnimi padavinami v preteklih dneh, ki so izprale fungicidno oblogo, je ugodno za razvoj poznega škrlupa in ostalih skladiščnih boleznih. Za obnovitev fungicidne obloge sadjarjem priporočamo uporabo dotikalnih fungicidov kot so **Flint** (21 dni), **Zato 50 WG** (21 dni), **Luna Experience** (14 dni), **Pomax** (5 dni). Na poznejših sortah je še vedno priporočeno dati prednost pripravkom z a.s. kaptan. Uporabite lahko sredstva **Zato Plus** (35 dni), **Merpan 80 WDG** (28 dni), **Orthocide 80 WG** (28 dni), **Scab 80 WG** (21 dni), **Scab 480 SC** (21 dni). V ekološki pridelavi lahko uporabite pripravek **Vitisan**, ki deluje tudi proti mušji pegavosti in ima karenco 1 dan.

V primeru toče svetujemo škropljenje s pripravki na osnovi aktivne snovi kaptan (**Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC**).

### Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so navečini opazovanih lokacij ne stalni, kljub temu je potrebno izvajati varstvo v rednih 10 do 14 dnevnh razmakih. Na voljo so registrirana sredstva **Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG** in **Laser Plus**.

Za varstvo ekoloških nasadov je priporočena uporaba pripravkov **Laser, Agree WG, Lepinox plus, Carpovirusine** in **Madex Max**.

**V tem času bodite pozorni na karenčne dobe uporabljenih pripravkov, še posebno na zgodaj zorečih sortah!**

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrast!**

Pripravili: Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije