

## VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

10. avgust 2020

Vroči dnevi z ne predvidenimi padavinami in hladnimi nočmi so ugodni za razvoj glivičnih obolenj na listju in plodovih. Ohranjanje zdravega listja je pomembno za uspešno diferenciacijo brstov in ustrezno prehranjenost dreves v naslednjem letu. Uspeh pri skladiščenju pa je v veliki meri odvisen od zdravstvenega stanja plodov v času obiranja, zato je potrebno izvajati redno varstvo pred poznim škrlupom in ostalimi skladiščnimi boleznimi. Za varstvo poznihih sort še vedno priporočamo uporaba fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so **Merpan 80 WDG** (28 dni), **Orthocide 80 WG** (28 dni), **Scab 80 WG** (21 dni), **Scab 480 SC** (21 dni) ter sredstva na osnovi trifloksistrobina kot sta **Flint** (21 dni) in **Zato 50 WG** (21 dni). V kolikor predvidevate, da bo do obiranja minilo 35 dni (karenca) ali več lahko uporabite tudi pripravek **Zato Plus**.

Za varstvo zgodnjih sort so primerna sredstva s krajšo karenčno dobo. Uporabite lahko pripravke **Luna Experience** (14 dni), **Bellis** (7 dni), **Pomax** (5 dni), **Geoxe** (3 dni) ter pripravka **Vitisan** (1 dan) in **Amylo – X** (brez karence), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

### Jabolčni zavijač

V nasadih, kjer so ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe nad pragom škodljivosti, je še naprej potrebno izvajati kemično varstvo. Pripravki **Delegate 250 WG**, **Affirm**, **Affirm opti** in **Steward** so primerni za uporabo na zgodnejših sortah saj imajo karenco 7 dni. Na poznejših sortah lahko uporabite tudi sredstva z daljšo karenco kot so **Coragen**, **Mimic**, **Runner 240 SC**, **Calypso SC 480** ali **Mospilan 20 SG** ob upoštevanju predpisanega maksimalnega števila škropljenj v eni rastni dobi. Za zatiranje metuljev jabolčnega zavijača na zgodnjih sortah so učinkovita tudi sredstva, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi in imajo kratko karenco (**Laser Plus**, **Agree WG**, **Lepinox plus**, **Carpovirusine**, **Madex Max**).

**V tem času bodite pozorni na maksimalno število škropljenj ter karenčne dobe uporabljenih pripravkov, še posebno na zgodaj zorečih sortah!**

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrast!**

Pripravili: Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije