

VARSTVO VINSKE TRTE

10. avgust 2020

Večina sort vinske trte je že prešla v fazo zorenja in začetka sortno značilnega barvanja grozdnih jagod. Za zadnja škropljenja proti **peronospori vinske trte** svetujemo uporabo katerega od bakrovih pripravkov kot so **Badge WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, WG/ 50 WP/ Ultra WP, Cuproxat, Kocide 2000, Nordox 75 WG**, ki imajo 21 dnevno karenco. Za varstvo aromatičnih sort dajte pri izbiri prednost kateremu od drugih registriranih pripravkov na osnovi mankozeba kot so **Avtar 75NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45** ali **Mankoz 75 WG** (vsi karenca 28). V vinogradih, kjer so okužbe pogostejše, pa še vedno lahko uporabite katerega od kombiniranih pripravkov s krajšo karenčno dobo kot so **Mildicut, Electis 75 WG** ali **Sanvino**.

Ob pričetku mehčanja grozdnih jagod, je v primeru napovedi daljšega deževnega obdobja (nekaj dni) priporočljivo opraviti škropljenje proti **sivi grozdni plesni** (*Botrytis cinerea*). Škropljenje je potrebno izvesti pred padavinami z enim od registriranih pripravkov kot so **Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500** ali **Zenby**. Uporabite lahko tudi pripravke: **Amylo-X, Botector** ali **Serenade ASO**, ki so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Škropljenje z botriticidi je smiselno izvesti zgolj v coni grozdja, pri čemer je potrebno odmerek sredstva ustrezno prilagoditi.



Slika: *Botrytis cinerea* – siva grozdna plesen(foto arhiv KIS)

Pri izbiri sredstev upoštevajte veljavne registracije in bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt

Kmetijski inštitut Slovenije