

VARSTVO AMERIŠKIH BOROVMIC

21. 4. 2022

Zgodnje sorte ameriških borovnic, na pretežnem delu opazovanih lokacij, že začenjajo cveteti. V tem razvojnem stadiju je izjemno pomembno varstvo odprtih cvetov pred sekundarnimi okužbami z **monilijo ameriških borovnic**. Zaradi hladnega in relativno suhega vremena letos razmere za razvoj apotecijev niso bile ugodne. Kljub temu smo v nekaterih nasadih opazili primarne okužbe na zelenih poganjkih. Na sortah, ki že cvetijo priporočamo uporabo enega izmed fungicidov: **Signum**, **Teldor SC 500** ali **Serenade ASO**. Na sortah, ki so še v fazi brstenja pa lahko uporabite ali **Score 250 EC** ali **Mavita 250 EC** ali **Folicur EW 250**. Ob tem je potrebno cvetove borovnic zavarovati tudi pred okužbami z nekaterimi drugimi povzročitelji bolezni kot sta **antraknoza in siva plesen**. Za zatiranje **sive plesni** so registrirani fungicidni pripravki **Teldor SC 500**, **Serenade ASO Switch 62,5 WG**, **Amylo-X**, **Signum in Taegro**. Slednja dva delujeta tudi proti **antraknozi**. Škropljenje opravite tik pred napovedanimi padavinami.



Slika 1: okuženi vegetativni poganjki se posušijo. Na njih se pojavi plesniva prevleka iz katere se sproščajo spore, ki vršijo okužbe cvetov (foto: arhiv KIS).



Slika 2: okuženi vršički dobijo značilno podobo pastirske palice (foto: arhiv KIS).

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte!

Pripravila: David Snoj

Kmetijski inštitut Slovenije