

VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

4.4.2022

Zadostna vlažnost tal ter postopno višanje povprečnih temperatur ustvarja ugodne pogoje za razvoj apotecijev **monilije borovnic**, ki povzročajo zgodnje okužbe vegetativnih poganjkov s to boleznijo. Sadjarjem svetujemo pregledovanje nasadov. Ob prvem pojavu trosišč priporočamo izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice **kremenčevega peska, zelene galice in dušikovega gnojila**). V primeru ugodnih razmer za okužbe (vlažno vreme in nizke nočne temperature) bo potrebno opraviti preventivno škropljenje s sistemskim fungicidom kot je **Score 250 EC, Mavita 250 EC** ali **Folicur EW 250**. Uporaba sredstev je dovoljena od začetka brstenja do začetka cvetenja.



Slika: Apoteciji glive *Monilinia vaccinii-corymbosi* - povzročiteljice monilije ameriških borovnic (foto arhiv KIS)

Upoštevajte veljavne registracije pripravkov in sredstvom priložena navodila!

Prpravila: David Snoj in Primož Žigon

Kmetijski inštitut Slovenije