

VARSTVO KOŠČICARJEV

4. 4. 2022

Nestanovitno vreme v obdobju cvetenja breskev, višenj in češenj je ugodno širjenje okužb s **cvetno monilijo**. Za preventivo varstvo pred omenjeno boleznijo je priporočljivo opraviti dvoje škropljenj. Prvo škropljenje opravimo ob začetku cvetenja, ko je odprtih najmanj 10 % cvetov. Drugič je potrebno škropiti po koncu polnega cvetenja, ko začno odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko naslednje registrirane fungicide **Chorus 50 WG** (breskev), **Duaxo koncentrat** (češnja, višnja), **Luna experience**, **Prolectus**, **Signum**, **Switch 62,5 WG**, **Zenby** (breskev, višnja, češnja) ali **Teldor SC 500** (češnje, višnje). Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi mikroorganizmov kot so **Serenade ASO** (breskev), **Amylo-X**, **Prestop** ali **Taegro** (breskev, višnja, češnja).

Za varstvo breskev in nektarin pred **breskovo kodravostjo** lahko v do konca cvetenja ponovno uporabite sredstvi **Syllit 544 SC** ali **Syllit 400 SC**. Škropljenja opravite pred napovedanimi padavinami.



Slika: Odpiranje cvetov pri češnji (foto arhiv KIS)

Upoštevajte veljavne registracije pripravkov in sredstvom priložena navodila!

Pripravila: David Snoj in Primož Žigon

Kmetijski inštitut Slovenije