

VARSTVO PEČKARJEV

4. 4. 2022

Nedavne padavine so bile na večjem delu Slovenije obilne in so sprale fungicidno oblogo. Za varstvo pred **škrlupom** svetujemo, da nasade jablan in hrušk ponovno poškopite z ustreznimi fungicidi.

Do cvetenja jablan in hrušk je priporočljiva uporaba kontaktnih pripravkov na osnovi ditianona (**Alcoban**), metirama (**Polyram DF**) ali dodina (**Syllit 400 SC, Syllit 544 SC**). V ekoloških nasadih lahko opravite škropljene z žvepleno-apneno brozgo (pripravek **Curatio**).

Na hladnejših legah za varstvo poznejših sort, ki so še v fazi mišjega ušesca lahko ponovno uporabite katerega od bakrovih fungicidov kot so **Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Kocide 200**.



Slika: Sorte jablan, ki zgodaj odganjajo, so ponekod že tik pred cvetenjem (foto arhiv KIS)

Pred cvetenjem jablan in hrušk lahko v nasadih, kjer imate več težav z obvladovanjem **ameriškega kaparja**, uporabite pripravek **Harpun**.

Za odvrčanje **hruševe bolšice** je do cvetenja hrušk priporočljivo obnavljati nanos kaolinskih glin. Kjer ste imeli v preteklih letih več težav z obvladovanjem hruševe bolšice je pred cvetenjem smiselna uporaba insekticida **Harpun**. Pripravek učinkovito deluje na ličinke zgodnjih razvojnih stadijev, zato je za določitev optimalnega časa rabe potrebno spremljati razvoj škodljivcev in ukrepati ob pričetku izleganja ličink iz jajčec. Boljšo učinkovitost zatiranja dosežemo, če uporabo insekticida kombiniramo z oljnimi pripravki (npr. **Ovitex** ali **Frutapon**).

V nasadih, ki so tik pred cvetenjem izobesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta **jabolčne in hruševe grizlice**. Prag škodljivosti je presežen, če se do konca cvetenja ujame na ploščo najmanj 30 osic. Proti grizlicam se ukrepa šele po koncu cvetenja.

Upoštevajte veljavne registracije fitofarmaceutskih sredstev in priložena navodila!

Pripravila: David Snoj in Primož Žigon

Kmetijski inštitut Slovenije