

VARSTVO OREHOV

4.7.2022

Pridelovalce orehov obveščamo, da je sedaj primeren čas za spremljanje naleta orehove muhe. V ta namen priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč s **privabilom**. Vabe je potrebno postaviti na dveh mestih v nasadu, pri čemer naj bo ena vaba na višini okoli 2 m, druga na višini okoli 6 m, med seboj naj bosta vabi oddaljeni vsaj 10 m. Priporočeni termin za zatiranje muhe je 5 dni po prvem ulovu na rumeno lepljivo ploščo. Uporabite lahko pripravke kot so **Imidan 50WG** ali **Laser 240 SC** ter **Laser plus**, slednjega je priporočljivo uporabiti v kombinaciji s prehransko vabo **Nutrel**. Za škropljenje zastrupljene vabe je predvidena zelo majhna količina vode ob uporabi šob, ki oblikujejo velike kaplje. V ekološki pridelavi je dovoljena le uporaba pripravkov **Laser 240 SC** ter **Laser plus**, prav tako v kombinaciji s prehransko vabo **Nutrel**. V primeru, da se po opravljenem škropljenju na rumeno lepljivo ploščo še vedno lovijo muhe je potrebno v presledku enega do dveh tednov škropljenje ponoviti. Prav tako je potrebno škropljenje ponoviti tudi v primeru obilnejših padavin, ki izperejo zastrupljeno vabo.



Slika: orehova muha lahko povzroči veliko škodo v nasadih orehov (foto:arhiv KIS)

Za varstvo posameznih dreves, je možno tudi prekrivanje površine pod drevesi s proti inšketno mrežo ali kopreno. Prekrivka mora biti trdno nameščena in ob robovih tesno stisnjena ob tla. Prekrivko je potrebno pustiti vse do konca septembra. Tako preprečimo muham, ki se izlegajo pod drevesom, da izletijo na drevo. Večji del škode lahko na ta način preprečimo, kljub temu pa jo nekaj povzročijo muhe, ki priletijo iz okolice. Možna je tudi uporaba registrirane insekticidne pasti **Decis trap orehova muha**.

Za varstvo posameznih dreves, je možno tudi prekrivanje površine pod drevesi s proti inšketno mrežo ali kopreno. Prekrivka mora biti trdno nameščena in ob robovih tesno stisnjena ob tla. Prekrivko je potrebno pustiti vse do konca septembra. Tako preprečimo muham, ki se izlegajo pod drevesom, da izletijo na drevo. Večji del škode lahko na ta način preprečimo, kljub temu pa jo nekaj povzročijo muhe, ki priletijo iz okolice. Možna je tudi uporaba registrirane insekticidne pasti **Decis trap orehova muha**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije posameznih pripravkov in priporočila za varstvo okolja! Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast!

Pripravil: David Snoj,

Kmetijski inštitut Slovenije