

VARSTVO PEČKARJEV

4.7.2022

Pridelovalcem svetujemo naj še naprej izvajajo redno varstvo proti jablanovemu škrlupu s sredstvi na osnovi kaptana (**Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Merplus, Ortocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC**). Še posebno pozorni bodite na lokalne nevihte, ki lahko sperejo fungicidno oblogo in neurja s točo, ki povzročijo poškodbe rastlinskih tkiv. V ekoloških sadovnjakih lahko uporabite pripravke **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Pri varstvu nasadov pred jablanovo pepelovko je ob padcu temperatur ponovno primerna uporaba žveplovih pripravkov. V zelo močno okuženih nasadih je še vedno možna aplikacija sistemičnih fungicidov kot so **Luna experience, Stroby WG, Zato, Zato plus, Tercel, Topas 100 EC, Topaze, Sercadis ali Sercadis plus**. Za doseganje zadovoljive učinkovitosti je poleg škropljenja, nujno potrebno odstranjevanje plesnivih poganjkov.



Slika1: škropljenje proti jablanovi pepelovki, brez odstranjevanja plesnivih poganjkov ni dovolj učinkovito (Foto: arhiv KIS)

Vroče vreme je ugodno za razvoj pršic v nasadih, zato bodite pozorni na morebitne prerazmnožitve. Uporabite lahko akaricidna sredstva kot so **Vertimec PRO, Shirudo, Milbeknock, Kanemite SC**.

Sadjarje opozarjamo, bodite pozorni na morebitne znake okužb s hruševim ožigom. Tveganje predstavljajo predvsem nasadi, ki so dolgo pocvitali. V tem času prepoznamo okužbe po venečih, rjavečih in ukrivljenih poganjkih (oblika pastirske palice). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali območno enoto javne službe za varstvo rastlin.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije posameznih pripravkov in priporočila za varstvo okolja! Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast!

Pripravil: David Snój,

Kmetijski inštitut Slovenije