

VARSTVO PEČKARJEV

12.8.2022

Za zaključna škropljenja v nasadih pečkarjev priporočamo uporabo fitofarmaceutskih sredstev, ki učinkujejo proti poznemu škrlupu in drugim skladiščnim boleznim. Uporabite pripravke s krajšimi karenčnimi dobami kot so **Bellis** (7 dni karence), **Geoxe** (3 dni), **Pomax** (5 dni), **Luna Experience** (14 dni), **Scala** (7 dni), **Switch** (3 dni). Možna je tudi uporaba sredstva na osnovi mikroorganizmov, **Amylo-X** (brez karence) ali pripravkov na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata kot sta **Karbicure** (1 dan) in **Vitisan** (1 dan).

Pri sortah, ki dozorevajo pozno, je v avgustu še vedno priporočljivo opraviti škropljenje s sredstvi na osnovi kaptana kot so **Zato plus** (35 dni karence), **Zato 50 WG** (21 dni), **Merplus** (28 dni), **Captan** (28 dni), **Merpan 80 WDG** (28 dni), **Orthocide 80 WG** (28 dni), **Scab 80 WG /480 SC** (21 dni) ali **Luna Care** (28 dni).

Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na karenčne dobe in izbiro prilagodite predvidenemu terminu obiranja!



Slika: Plodovi okuženi z jablanovim škrlupom so iznakaženi, slabše kakovosti ter se slabše skladiščijo. (foto: arhiv KIS)

Jabolčni zavijač lahko povzroči precejšnjo škodo tudi pozno v sezoni. Sadjarjem svetujemo, da opravijo še zadnje škropljenje proti škodljivcu le v primeru, **da je prag škodljivosti presežen in je hkrati od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni**. Uporabite sredstva s krajšo karenco kot so **Affirm**, **Affirm opti**, **Delegate 250 WG** ali **Laser plus**.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in karenčne dobe ter jih upoštevajte. Ob uporabi insekticidov odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih!

Pripravi: David Snoj, Kmetijski inštitut Slovenije