

FUNGICIDI ZA ZATIRANJE BOLEZNI NA AMERIŠKIH BOROVNICAH

Podatki iz registra FSS, 3.3. 2021

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek L, kg / ha	Karenca dni	Bolezni	Razvrstitev po FRAC ¹
Folicur EW 250	tebukonazol	0,8	čas uporabe	cvetna monilija	3
Mavita 250 EC	difenkonazol	0,4			3
Score 250 EC					
Teldor SC 500	fenheksamid	1,5	3	siva plesen	17
Switch 62,5 WG	ciprodinil fludioksonil	1	10		9 12
Stroby WG	krezoksim-metil	0,2	21	ameriška kosmuljeva pepelovka in pepelovke iz rodu <i>Microsphaera</i>	
Signum	boskalid piraklostrobin	1	7	siva plesen in antraknoza	7 11
Champion 50 WG	baker v obliki bakrovega hidroksida	0,75	čas uporabe	cvetna monilija, odmiranje stebel borovnic, sušenje vej na borovnicah in druge bolezni	M1
Cuprblau 35 WG, Cuprblau 35 WP	baker v obliki bakrovega oksiklorida	2-3		odmiranje stebel borovnic, sušenje vej na borovnicah, črna pegavost, listne pegavosti, koreninska gniloba borovnic, bakterijske pegavosti	
Biotip Sulfo 800 SC	žveplo	3-5	7	ameriška kosmuljeva pepelovka	M2
Thiovit Jet		4-5		pepelovke	
Microthiol Disperss		7		ameriška kosmuljeva pepelovka	
Microthiol Special				M2	
Vitisan	kalijev hidrogen karbonat	5	1	ameriška kosmuljeva pepelovka	NC
Amylo-X	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> , sev D747	1,5-2,5	ni potrebna	siva plesen, pepelovke iz rodu <i>Podsosphaera</i>	/

Serenade ASO	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713 <i>subtilis</i>	8	ni potrebna	siva plesen, ameriška kosmuljeva pepelovka	/
Taegro	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. FZB2,	0,187- 0,37	1	siva plesen	

¹ razvrstitev po FRAC: v skupine po načinu delovanja. Za preprečevanje odpornosti kombinirati snovi z različnimi načini delovanja.